

| | | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | |
|----|--------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| 内服 | エスワンタイホウ ※投与量:表面の表1参照 | | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | | |
| | アプレピタントカプセル | | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | タ | |
| | | | | | | | | | | 125mg | 80mg | 80mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


① or ②

注射

| |
|--|
| 生理食塩液 100mL ルートキープ |
| ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 硫酸Mg補正液 8mL 点滴静注 120分 |
| ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分 【※day9,day10のみ】 |
| ソルデム3A 500mL 1袋 デカドロン注 6.6mg 点滴静注 120分 【※day9,day10のみ】 |
| ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分 【※day9,day10のみ】 |
| ソルデム3A 500mL 1袋 ラシックス20mg 1管 点滴静注 120分 |
| グラニセトロン3mg/100mL デカドロン 9.9mg 点滴静注 30分 |
| シスプラチン60mg/m ² 生理食塩液 400mL 点滴静注 120分 |
| ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分 |
| ソルデム3A 500mL 1袋 点滴静注 120分 |
| ソリューゲンG500mL 1瓶 点滴静注 120分 |

③

| |
|---|
| day8のアプレピタントカプセルは、 ソルデム3A500mL+ラシックス20mg を投与開始時に内服する。 |
| 生理食塩液500mL 1袋 点滴静注 150分 |



【※注意】シスプラチン投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール等の利尿剤を投与すること。尿量は、投与当日は3000mL、投与後3日間は1500mL以上の尿量を確保することが望