フムシル	マフ/パクリタキセル療法の投与スケジ=	ュール																			コン	<u>'ール</u>	, 20	
		Day 1		2 3	4	5	6	7 8	9 10	11	12	13	14 15	16 1	7 18	19	20	21	22	23	24	25 2	26 2	27 2
内服	レスタミンコーワ錠(10mg) サイラムザ投与30分前 パクリタキセル単独投与時は 前投薬開始時に内服	5鸇	定					5錠					5錠											
注射薬	生理食塩液100mL (ルートキープ) サイラムザ点滴静注液 8 mg/kg 生理食塩液 全量 250mL 点滴静注 初回 60分 2回目以降 30分 (忍容性が良好な場合) 生理食塩液100mL (ルートフラッシュ)			※投与30 ノスタミン			内服							※投与 レスタ ミ			を内が	服						
	ファモチジン注 20mg 1管 デカドロン注 6.6mg 1管 デカドロン注 1.65mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分 グラニセトロンバック 3mg/100mL 点滴静注 30分								※投与: レスタミ			上内服	Ž											
	パクリタキセル注 80mg/m ² 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注 60分 【滴数を1.6倍にして投与する】 生理食塩液100mL (ルートフラッシュ)																							