

XP療法の投与スケジュール

1クール 21日間

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カペシタピン 300mg 2000mg/m ²			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝						
	アプレピタント カプセル		タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ	タ							
			125mg	80mg	80mg																		

① or ②
③

<p>注射</p> <p>生理食塩液 100mL ルートキープ</p> <p>ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 硫酸Mg補正液 8mL 点滴静注 120分</p> <p>ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分 【※day2,day3のみ】</p> <p>ソルデム3A 500mL 1袋 デカドロン注 6.6mg 点滴静注 120分 【※day2,day3のみ】</p> <p>ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分 【※day2,day3のみ】</p> <p>ソルデム3A 500mL 1袋 ラシックス20mg 1管 点滴静注 120分</p> <p>グラニセトロン3mg/ 100mL デカドロン 6.6mg 1管 デカドロン 3.3mg 1管 点滴静注 30分</p> <p>シスプラチン80mg/m² 生理食塩液 400mL 点滴静注 120分間</p> <p>ソリューゲンG500mL 1瓶 プリンペラン10mg 1管 点滴静注 120分</p> <p>ソルデム3A 500mL 1袋 点滴静注 120分</p> <p>ソリューゲンG500mL 1瓶 点滴静注 120分</p>	<p>day1のアプレピタントカプセルは、ソルデム3A500mL+ラシックス20mgを投与開始時に内服する。</p>	<p>生理食塩液500mL 1袋 点滴静注 150分</p>		<p>【※注意】シスプラチン投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール等の利尿剤を投与すること。尿量は、投与当日は3000mL、投与後3日間は1500mL以上の尿量を確保することが望ましい。</p>
--	--	------------------------------------	--	---