

CBDCA/PTX 1-B(分割投与法)療法の投与スケジュール

1クール 21~28日間

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
経口投与	レスタミンコーワ錠(50mg) 1本目の前投薬(デカドロン+ファモチジン+生理食塩液)を開始と同時に服用する。		5錠							5錠																					
(※アプレピタントカプセルを服用する際には、レスタミンコーワ錠と同時に125mgカプセルを服用する。2日目、3日目は1日目に服用した時間と同じ位の時間に80mgカプセルを1カプセル服用する。)																															
点滴注射	生理食塩液 100mL (ルートキープ)																														
	デカドロン注 8.25mg ファモチジン注 20mg 1管 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																														
	グラニセトロン3mgバック100mL 点滴静注 30分																														
	パクリタキセル 100mg/m ² 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分 【滴数を1.6倍にして投与する】																														
	カルボプラチン AUC 3 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分																														
	プリンペラン 10mg 1管 ソルデム3A輸液 200mL 点滴静注 30分																														

※同時にレスタミンコーワを内服

※同時にレスタミンコーワを内服