

CBDCA/PTX/ベバシズマブ 9-B(分括投与法)療法の投与スケジュール

1クール 21~28日間

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

経口投与  
レスタミンコーワ(10mg) 5錠  
1本目の前投薬(デカドロン+  
ファモチジン+生理食塩液)の  
開始と同時に服用する。

5錠

5錠

(※アプレピタントカプセルを服用する際には、レスタミンコーワと同時に125mgカプセルを服用する。2日目、3日目は1日目に服用した時間と同じ位の時間に80mgカプセルを1カプセル服用する。)

点滴注射  
生理食塩液 100mL  
ルートキープ  
デカドロン注 8.25mg  
ファモチジン注 20mg 1管  
生理食塩液 100mL  
点滴静注 30分  
グラニセトロン3mg/バック100mL  
点滴静注 30分  
パクリタキセル 100mg/m<sup>2</sup>  
生理食塩液 250mL  
点滴静注 60分  
カルボプラチン AUC 3  
生理食塩液 250mL  
点滴静注 60分  
プリンペラン 10mg 1管  
ソルデム3A輸液 200mL  
点滴静注 30分  
ベバシズマブ 15mg/kg  
生理食塩液 100mL  
点滴静注  
1回目 90分  
2回目 60分  
3回目以降 30分  
生理食塩液 100mL  
ルートフラッシュ

※同時にレスタミン  
コーワを内服

※同時にレスタミン  
コーワを内服

※day8は、ベバシズマブはやりません。