

CBDCA/PEM/ベバシズマブ療法の投与スケジュール

1クール 21日間

Day	↓ 初回の7日前より	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	最終投与日より 22日目まで↓
経口投与	フォリアミン錠5mg 0.1錠 1日1回経口投与 アプレピタントカプセル 分1 カルボプラチン開始1時間前に内服	ペメトレキセドの初回投与7日前～最終投与22日目まで可能な限り投与する。																					
		125mg	80mg	80mg																			
(※アプレピタントカプセルを服用する際には、カルボプラチン開始の1時間前に125mgを服用する。 2日目、3日目は1日目に服用した時間と同じ位の時間に80mgカプセルを1カプセル服用する。)																							
筋肉注射	メコバラミン注(500μg/1mL)2管 1日1回 筋肉注射	投与7日 以上前 に投与 以後9週毎																					
点滴注射	生理食塩液 100mL ルートキープ																						
	デカドロン 6.6mg グラニセトロン3mg/バック 100mL 点滴静注 30分																						
	ペメトレキセド 500mg/m2 生理食塩液 100mL 点滴静注 10分																						
	カルボプラチン AUC 5 生理食塩液 250mL 点滴静注 60分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						
	ベバシズマブ15mg/kg 生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分																						
	生理食塩液 100mL ルートフラッシュ																						

1本の
生理食塩液を
使用する。