

ラムシルマブ/ドセタキセル療法の投与スケジュール

1クール 21日間

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
経口投与	レスタミンコーワ錠(10mg) サイラムザ投与30分前		5錠																					
	【末梢性浮腫予防】 デカドロン錠4mg 2錠 分2 朝夕食後 ※不眠時には朝昼食後で内服			朝食後	朝食後	朝食後																		
	【抗生物質】 レボフロキサシン錠500mg 頓服 ※発熱時 38度以上で 1錠内服し連絡して来院する。 (念の為、3日分処方。)			夕食後	夕食後	夕食後																		
注射薬	生理食塩液100mL (ルートキープ)																							
	サイラムザ点滴静注液※※ 10 mg/kg 生理食塩液 全量 250mL 初回 60分 2回目以降 30分(忍容性が良好な場合)																							
	グラニセトロンバッグ 3mg/100mL デカドロン注 6.6mg 点滴静注 30分																							
	ドセタキセル注 60mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖注 250mL 点滴静注 60分 【滴数を1.4倍にして投与する】																							
	生理食塩液100mL (ルートフラッシュ)																							

※投与30分前に  
レスタミンコーワ錠を内服