「ノマン原仏の技子ペックユール					「ノルノ口間			
	Day	1	2	3	44	5	6	7
生理食塩液100mL								
(ルートキープ)								
ブル・メドロール 40mg								
ポララミン 5mg								
生理食塩液 100mL								
点滴静注 30分								
リツキシマブ 375 mg/m2								
生理食塩液 500mL								
点滴静注								
◆初回								
最初の30分は50mg/時								
その後、30分毎に50mg/時ずつ上げて								
最大400mg/時まで可能								
◆2回目以降								
最初の30分は100mg/時								
その後30分毎に100mg/時ずつ上げて								
最大400mg/時まで可能								
生理食塩液100mL								
(ルートフラッシュ)								

リツキシマブ投与中の注意 infusion reaction 患者の状態を把握し、バイタルや症状が問題ない場合に投与速度を上げること。

本剤の投与開始後30分~2時間よりあらわれるinfusion reactionのうちアナフィラキシー様症状、肺障害、心障害等の重篤な副作用が報告されているため、本剤投与中はバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数等)のモニタリングや自他覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分観察すること。特に以下の患者については発現頻度が高く、かつ重篤化しやすいので注意すること。
(1) 血液性に大量の腫瘍細胞がある(25,000/μ以以上)など腫瘍量の多い患者

- (2) 脾腫を伴う患者
- (3) 心機能、肺機能障害を有する患者