

R-THP COP療法の投与スケジュール

		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
内服	プレドニン内服 30mg/m ²																							
注射	生理食塩液 100mL (ルートキープ)																							
	ソル・メドロール 40mg ポララミン 5mg 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																							
	リツキシマブ 375 mg/m ² 生理食塩液 500mL 点滴静注 ◆初回 最初の30分は50mg/時 その後、30分毎に50mg/時ずつ上げて 最大400mg/時まで可能 ◆2回目以降 最初の30分は100mg/時 その後30分毎に100mg/時ずつ上げて 最大400mg/時まで可能																							
	生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																							
	生理食塩液 100mL (ルートキープ)																							
	グラニセトンバック3mg/100mL 点滴静注 30分																							
	テラルビシン 30 mg/m ² 生理食塩液 100mL 点滴静注 30分																							
	オンコビン 1 mg/m ² 生理食塩液 50mL 点滴静注 15分																							
	エンドキサン 500 mg/m ² 5%ブドウ糖250mL 点滴静注 1時間																							
	生理食塩液 100mL (ルートフラッシュ)																							

リツキシマブ投与中の注意 infusion reaction

本剤の投与開始後30分～2時間よりあらわれるinfusion reactionのうちアナフィラキシー様症状、肺障害、心障害等の重篤な副作用が報告されているため、本剤投与中はバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数等)のモニタリングや自覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分観察すること。特に以下の患者については発現頻度が高く、かつ重篤化しやすいので注意すること。

- (1) 血液中に大量の腫瘍細胞がある(25,000/μL以上)など腫瘍量の多い患者
- (2) 脾腫を伴う患者
- (3) 心機能、肺機能障害を有する患者