テモゾロミド/ベバシズマブ/RT療法の投与スケジュール

8コース目以降はアバスチン投与のみ継続する。

テモゾロミド内服の場合				1コース目 70日間
メトクロプラミド錠5mg※	Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	42 43 ~ 57 ~ 70
メトクロプラミド錠5mg※ 1日1回 1回2錠 起床時				
テモゾロミドカプセル 1日1回 75mg/m2 朝食前				
バクタ錠※※ 1日1回 1回1~2錠				
連日又は週3日 経口 				
生理食塩液 100mL ルートキープ				
アバスチン 10mg/kg 生理食塩液 100mL 点滴静注				
点滴静注 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分				
<u>生理食塩液 100mL</u> ルートフラッシュ				
放射線 1回 2.0Gy 週5日 6週間 (総線量 60Gy)				
一型の日 6週间 (総線重 60Gy) 一 テモゾロミド点滴静注の場合				
	Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	42 43 ~ 57 ~ 70
バクタ錠※※ 経口 1日1回 1回1~2錠 連日又は週3日 経口				
生理食塩液 100mL ルートキープ				
プリンペラン注10mg※ 点滴 生理食塩液 100mL				
点滴静注 30 分 				
75mg/m2 生理食塩液 mL 【全量を250mLとする】				
点滴静注 90分 				
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ				
アバスチン 10mg/kg 生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分				
2回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分				
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ				
放射線 1回 2.0Gy 週5日 6週間 (総線量 60Gy)				
テモゾロミド内服の場合	Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		A目 28日間 27 28	
カイトリル錠1mg 1日1回 1回2錠 起床時				
経口テモゾロミドカプセル				
1日1回 150~200mg/m ² 朝食前 (※2コース目は150mg/m ²)				
生理食塩液 100mL ルートキープ				
アバスチン 10mg/kg 生理食塩液 100mL 点滴静注				
点滴静注 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分				
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ				
生理食塩液 100mL	Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2	27 28	
ルートフラッシュ グラニセトロンバッグ				
3mg/100mL 点滴静注 30 分				
テモゾロミド点滴静注用 150~200mg/m² 生理食塩液 mL 【全量を250mLとする】				
点滴静注 90分				
(※2コース目は150mg/m²)点滴生理食塩液 100mLルートフラッシュ				
アバスチン 10mg/kg				
生理食塩液 100mL 点滴静注 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分				
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ				
-	Dov. 1 0 0 4 5 0 7 0 0 40 44 15 15	8コース目以降 21日間		
生理食塩液100mL	Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21		
ルートキープ				
アバスチン 15mg/kg 生理食塩液 100mL 点滴静注				
点滴 1回目 90分 2回目 60分 3回目以降 30分				
生理食塩液 100mL ルートフラッシュ				